

PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO PER GLI OPERATORI NON SANITARI CHE ACCEDONO A MONTECATONE

Gli operatori non sanitari che accedono all'Ospedale di Montecatone, come ad es. volontari, consulenti alla pari, assistenza non sanitaria (ANS), insegnanti, frequentatori, parrucchieri, ecc., sono tenuti ad adottare le seguenti precauzioni per la prevenzione del rischio biologico durante lo svolgimento delle diverse attività:

- × **igiene delle mani;**
- × **uso di dispositivi** di protezione individuale (guanti, mascherine, occhiali, visiere, camici monouso, copricapo, copriscarpe);
- × **igiene respiratoria** (proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse).

PRIMA DI INIZIARE L'ATTIVITA' CON GLI UTENTI RICOVERATI

Gli operatori non sanitari devono:

- chiedere agli operatori di reparto quali sono le stanze di degenza in cui si trovano pazienti per i quali è necessario utilizzare i dispositivi (es. camice e guanti) oltre ad effettuare l'igiene delle mani;
- comunicare tempestivamente l'eventuale stato di gravidanza, affinché venga evitato il contatto con pazienti colonizzati o con infezione in atto.

REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L'ATTIVITA' CON GLI UTENTI RICOVERATI

1. **NON SEDERSI SUI LETTI** dei pazienti e utilizzare esclusivamente i bagni per i visitatori (e non quelli riservati ai degenti).
2. **IGIENIZZARE LE MANI**, sempre prima e dopo il contatto con il paziente e l'ambiente che lo circonda.

CON GEL ALCOLICO	CON ACQUA E SAPONE SEMPRE: SE VISIBILMENTE SPORCHE O IN CASO DI CLOSTRIDIUM DIFFICILE
 <p>20-30 SECONDI</p>	 <p>40-60 SECONDI</p>

3. Utilizzare i guanti SOLO SE NECESSARIO, quando si entra in contatto con:

- gli oggetti che circondano il paziente che si considerano potenzialmente contaminati in caso di paziente colonizzato o con infezione in atto (es. comodino, parti del letto, campanelli, telecomandi del letto e televisione, biancheria, ecc.);
- con la cute non integra;
- con liquidi biologici dell'utente.

L'utilizzo dei guanti non sostituisce il lavaggio delle mani.

Prima e dopo l'utilizzo dei guanti è necessario igienizzare le mani.

4. Utilizzare il CAMICE MONOUSO quando si entra nella stanza di pazienti colonizzati o con infezione in atto (chiedere al personale di Reparto).

In tal caso il camice deve essere indossato quando si entra nella camera e va sempre tolto prima di uscire dalla stanza; questo per evitare di trasferire i microrganismi ad altri pazienti e all'ambiente.

5. Utilizzare Mascherina FFP2 con o senza visiera/occhiali protettivi, quando si entra nella stanza di pazienti con patologie tramissibili per via aerea (es. morbillo, varicella) o goccioline (es. pertosse, rosolia).

L'accesso alla stanza di degenza in questi casi viene limitato e deve essere concordato con il personale di Reparto.

COMPORAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI INFORTUNI A RISCHIO BIOLOGICO

In caso di **esposizione a rischio biologico** (es. puntura/ferita con aghi/oggetti taglienti, o schizzi/spandimenti su mucose o cute non integra) **con sangue o qualsiasi altro materiale biologico contenete sangue in quantità visibile (es. urine, vomito, feci)** la persona esposta **deve** immediatamente:

- Recarsi nel Reparto di appartenenza del paziente fonte di contatto e rivolgersi al Medico di Reparto (nei giorni festivi e nelle ore serali al Medico di Guardia della Sub-Intensiva). È cura del Medico dare le indicazioni per i primi adempimenti da effettuare
- Segnalare tempestivamente l'infortunio al Servizio di Medicina Preventiva per valutare la necessità di mettere in campo eventuali azioni correttive.